

修平科技大學流感疫苗接種須知及意願書

保護效果：

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符、以及不同年齡或身體狀況而異，平均約為 30-80%。由於每年流行的流感病毒型別不一定相同，因此，每年均須重新接種。本年度政府採購四價流感疫苗，其保護效力與國際各國狀況相同，包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：

雞胚胎蛋培養疫苗	A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)
細胞培養疫苗	A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus
重組疫苗(Flublok 四價流感疫苗)	A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus ; A/Minnesota/41/2019 (an A/Hong Kong/45/2019- like virus) (H3N2); B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus ; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus 美國專案進口，尚未取得我國藥物許可證，限 18 歲以上接種

接種後至少約需 2 週的時間以產生保護力，其保護效果可持續 1 年。完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

接種禁忌：

- 一、已知對疫苗的成份有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

接種注意事項：

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿 6 個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。
- 四、已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察 30 分鐘，無不適症狀再離開。
- 五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。



安全性及副作用：

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，故不會因接種流感疫苗而得到流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後 1 至 2 天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其它曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。



流感疫苗接種意願書

我已經閱讀並瞭解流感疫苗的相關資訊，亦確認我的子女無上述接種禁忌，並且願意接種

我的子女 班級：_____ 學號：_____ 姓名：_____

家長簽名：_____（請簽中文全名）日期：_____年_____月_____日